

Neoferon® 80mg

Fer Comprimés pelliculés



Posologie :

• Traitement curatif :

Enfant à partir de 6 ans : 1 comprimé par jour.
Enfant à partir de 10 ans et adulte : 1 à 2 comprimés par jour.

• Traitement préventif :

Femme enceinte : 1 comprimé par jour ou tous les 2 jours pendant les 2 derniers trimestres de la grossesse (ou à partir du 4^{ème} mois).

Mode d'administration :

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec un grand verre d'eau.

5- GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse :

• Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être prescrit pendant la grossesse.

Allaitement :

• l'administration de ce médicament est possible chez la femme qui allaite.

6- EFFET SUR LA CAPACITÉ À CONDUIRE DES VÉHICULES ET À UTILISER DES MACHINES :

Le sulfate ferreux n'influence en aucun cas la capacité à conduire les véhicules ou à utiliser les machines.

7- QUELS SONT LES EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS DE CE MÉDICAMENT ?

Comme tous les autres médicaments, Neoferon® peut provoquer des effets plus ou moins gênants tels :
Troubles respiratoires et thoraciques : Œdème laryngé.

Troubles gastro-intestinaux : état nauséux, Constipation, diarrhée, distension du ventre, douleur abdominale, selles décolorées, digestion difficile et douloureuse, vomissement, ulcération buccale, coloration des dents.

La coloration des selles en noir est normale avec ce médicament.

Réactions allergiques, Prurit, urticaire.

SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET GÉNANT OU INDÉSIRABLE QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ SUR CETTE NOTICE.

8- SI VOUS AVEZ UTILISÉ UNE DOSE PLUS IMPORTANTE QUE VOUS N'AURIEZ DU :

Ne pas dépasser la posologie prescrite et en cas de surdosage consulter immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital le plus proche.

9- PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION :

À conserver à une température ne dépassant pas 30°C dans son emballage.

Tenir hors de la portée des enfants.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

N°.D.E. 20/12E128/418

Fabricant, conditionneur et détenteur
de la DE : Laboratoire Neomedic,
10 Z.I. Le Palma - Constantine 25000 Algérie



1- IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT:

• **Composition :** pour 1 comprimé

FER80 mg

Sous forme de Sulfate ferreux.....247.25 mg.

Excipients :qsp

Maltodextrine , copolymère d'ammoniométhacrylate, citrate de triéthyle, glycérol dibehénate, talc, colorant ,

• **Forme pharmaceutique et présentation :**

Boîte de 30 comprimés pelliculés.

• **Classe pharmaco-thérapeutique :**

Anti anémique.

2- DANS QUELS CAS POUVEZ-VOUS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

NEOFERON® est indiqué chez l'adulte et l'enfant dans les cas suivants :

• Anémie par carence en fer.

• Traitement préventif de la carence en fer chez la femme enceinte, lorsqu'un apport alimentaire suffisant en fer ne peut être assuré.

3- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT ?

• **Contre-indications :**

Ne prenez jamais NEOFERON® en cas de :

• Surcharge en fer, en particulier anémie (quantité insuffisante de globules rouges dans le sang) non liée à une carence en fer.

• Antécédents d'allergie à l'un des constituants.

• **Précautions d'emploi :**

La consommation importante de thé inhibe l'absorption de fer.

• **Mises en garde :**

• La diminution du taux de fer dans le sang associée aux syndromes inflammatoires n'est pas sensible au traitement par NEOFERON (fer).

• Le traitement avec le fer doit, dans la mesure du possible, être associé au traitement de la cause.

• En raison du risque de coloration dentaire et d'ulcération buccale, les comprimés ne doivent pas être sucés, croqués ou gardés dans la bouche mais ils doivent être avalés entièrement avec un grand verre d'eau.

• **Interactions médicamenteuses :**

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, notamment les sels de fer par voie injectable, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

4- COMMENT DEVEZ-VOUS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Réservé à l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans.





أو الصيدلاني بصفة منظمة عن أي دواء آخر تتناولونه.
4. كيف تستعملون هذا الدواء؟
 دواء مخصص للبالغين والأطفال فوق 6 سنوات من العمر.
المقادير:

- علاج الأنيميا :
- الأطفال من 6 سنوات : قرص واحد يوميا
- الأطفال من 10 سنوات والبالغين : قرص إلى قرصين يوميا.
- للوقاية لدى المرأة الحامل: قرص واحد في اليوم أو كل يومين خلال الفصلين الأخيرين من الحمل (أو بداية من الشهر الرابع)
- طريقة الاستعمال:**

عن طريق الفم،
 تؤخذ الأقراص مع كمية كافية من الماء .

- 5. الحمل والإرضاع:**
- الحمل :**

في الحالة العادية يمكن استعمال هذا الدواء خلال فترة الحمل.
الإرضاع :

يمكن استعمال هذا الدواء لدى المرأة المرضعة.

- 6. السيقاة و استعمال الآلات:**

لا يؤثر عنصر الحديد في أي حالة من الحالات على سيقاة المركبات أو استعمال الآلات.

- 7. مآهي الأآثر المرعج و غير المرعوب فيها هذا الدواء؟**

ككل الأدوية، يمكن أن يؤدي تناول نيوفيرون إلى ظهور تأثيرات مزعجة ك:

اضطرابات الجهاز التنفسي و الصدر: ودمة الحنجرة.
 اضطرابات الجهاز الهضمي: حالة غثيان، امساك، اسهال، انتفاخ البطن، الام البطن، براز عديم اللون، سوء الهضم، قيء، تفرح الفم، تلون الأسنان.
 تلون البراز باللون الأسود عند تناول هذا الدواء ظاهرة طبيعية. ردود فعل تحسسية، حكة، شرى جلدي.

إذا لاحظتم تأثيرات أخرى لم تذكر في هذه النشرة، أخبروا فوراً طبيبكم أو الصيدلي الذي تتعاملون معه.

- 8. إذا تناولتم جرعة زائدة من نيوفيرون :**

ينبغي احترام الجرعات الموصوفة، وبسبب استشارة الطبيب أو التوجه فوراً إلى أقرب مشفى في حالة تناولكم جرعة مفرطة.

- 9. شروط الحفظ:**

يحفظ هذا الدواء تحت درجة حرارة أقل من 30 °م في علبة الأصلية.

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال .

يجب عدم تجاوز تاريخ الصلاحية المدون على الغلاف

مقرر التسجيل رقم: 20/12E128/418

المصنع والمعبى وصاحب
 مقرر التسجيل مخبر نيوميديك
 10 المنطقة الصناعية بالما، قسنطينة 25000، الجزائر



التعريف بالدواء:

التركيب : يحتوي قرص على :

حديد 80 مغ

على شكل كبريتات الحديدوز 247.25 مغ.

سواغ ك

مالتو ديكتستين، كوبوليمير الامينو ميثاكريلات، ثلاثي

اينثيل السيترات، غليسيرول ديبهيينات ، طلق، ملون،

الشكل الصيدلاني:

علبة تحتوي على 30 قرص مغلف.

الفئة الصيدلانية العلاجية:

مُضادٌ فقر الدَّم

- 2. مآهي الحالات التي يستعمل فيها هذا الدواء ؟**

يوصف نيوفيرون للأطفال و البالغين في الحالات التالية:

• فقر الدَّم الناتج عن نقص عنصر الحديد.

• العلاج الوقائي لنقص الحديد لدى المرأة الحامل، عندما

لا يمكن ضمان كمية كافية من الحديد عن طريق التغذية.

- 3. مآهي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول هذا الدواء؟**

• **موانع الاستعمال:**

لا تتناولوا أبداً نيوفيرون إذا كنتم تعانيون من:

- زيادة في عنصر الحديد، خاصة الأنيميا (نقص في

كرات الدم الحمراء) غير المرتبطة بنقص عنصر الحديد.

- حساسية لأحد مكونات هذا الدواء.

• **إحتياطات الاستعمال:**

تناول الشاي بكثرة يمنع امتصاص الحديد، لذلك من

المستحسن عدم تناول الشاي مع هذا الدواء.

• **تحذيرات خاصة:**

حالة نقص مستوى حديد الدم المميز من مرض التهابي

لا تتجاوب مع نيوفيرون (العلاج بعنصر الحديد).

يجب بقدر المستطاع عند استخدام نيوفيرون ، مراقبته

بعلاج السبب.

نظراً لإمكانية تلون الأسنان و تفرحات الفم ، لا يجب

مض، قضم أو ترك الأقراص لمدة طويلة في الفم، انما

يجب بلعها كاملة مع كأس ماء.

• **تداخل أثر الدواء مع أدوية أخرى وتفاعلاتها:**

لنفادي أية تداخلات دوائية محتملة و بالأخص مع املاح

الحديد التي تستخدم عن طريق الحقن ، عليكم بإبلاغ طبيبكم

