

COMPOSITION:

Fluoxétine20 mg
Excipients q.s.p1 gélule

PRÉSENTATION:

Boîte de 20 gélules.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE:

Antidépresseur tricyclique.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES:

- Etats dépressifs.
- Troubles obsessionnels compulsifs.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION:

Ce médicament doit être administré en une seule prise journalière, matin ou soir pendant ou à distance des repas mais de préférence pas au coucher.

CONTRE-INDICATIONS:

- **ABSOLUES:**
 - Hypersensibilité à la fluoxétine.
 - Enfant de moins de 15 ans.
 - IMAO non sélectifs.
- **RELATIVES:**
 - IMAO sélectifs A.
 - Allaitement.

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE:

- Comme avec tout médicament psychotrope, la consommation d'alcool est déconseillée.
- Les personnes épileptiques ou ayant des antécédents d'épilepsie.
- Maladies du foie.
- Les sujets âgés.
- Diabète.
- Antécédents d'anomalie de l'hémostase.
- Traitement par les médicaments agissant sur la coagulation du sang.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES:

Associations contre-indiquées:

- IMAO non sélectifs.

Associations déconseillées:

- IMAO sélectifs A (moclobémide, toloxatone).

Associations nécessitant des précautions d'emploi:

- Anticoagulants oraux.
- Carbamazépine.
- Lithium.
- Antidépresseurs imipraminiques.
- Méthadone.
- Millepertuis.
- Phénytoïne.

Associations à prendre en compte:

- IMAO sélectifs B (sélégiline).
- Sumatriptan et autres agonistes des récepteurs 5HT_{1B/1D}.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT:

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser la fluoxétine pendant la grossesse. Bien que le passage de la fluoxétine dans le lait maternel soit faible, le traitement par la fluoxétine est déconseillé pendant l'allaitement.

CONDUITE ET UTILISATION DES MACHINES:

La fluoxétine pouvant modifier l'attention et les capacités de réaction, il convient de prévenir de ce risque les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machine.

EFFETS INDÉSIRABLES:

- **Troubles neuropsychiques:** nervosité, somnolence, céphalées, insomnie, tremblement, confusion mentale ...
- **Troubles gastro-intestinaux:** nausée, diarrhée, sécheresse buccale.
- **Troubles cutanés:** éruption, urticaire, oedème de Quincke, vascularite, érythème polymorphe.
- Hyponatremie.
- Augmentation des aminotransférases, hépatite cytotyrique.
- Troubles pulmonaires, cardiaques, sexuels...
- Troubles psychiques.

CONSERVATION:

A conserver dans un endroit frais et à l'abri de la lumière. Ne pas laisser à la portée des enfants.

نيوكزيتين[®]

فليوكزيتين 20 مغ

التركيب :

فليوكزيتين20مغ.

سواغ ك.ك.....1 كبسولة

الادوية غير المنصوح بها :

- مثبطات احادي امينو اوكسيداز انتقائية من زمرة A(موكلوميبيد ، تولوكساتون) .

ادوية تحتاج الى احتياطات خاصة :

- مثبط التخثر عن طريق الفم.
- كاربامزيبين.
- ليثيوم.
- مضادات الإكتئاب إيميبرامينية.
- مينادون.
- ميليارتوبيس.
- فينيتوين.

ادوية تحتاج الى الأخذ بعين الاعتبار :

- مثبطات احادي امينو اوكسيداز انتقائية من زمرة B (سيليجيلين).
- سوماتريبتان والمحفزات الأخرى للمستقبلات 5HT₂.

الحمل والرضاعة :

لا يجب استعمال هذا الدواء أثناء الحمل والرضاعة.

السياقة و استعمال الآلات :

هذا الدواء يمكن أن يقلص من الإنتباه لذا يجب تنبيه السائقين ومستعملي الآلات لهذا الخطر.

اعراض جانبية :

- اعراض عصبية و نفسية : قلق،نعاس،الام الراس،اضطرابات

النوم،رجفان،تخليط عقلي.

- اعراض هضمية:غثيا ،إسهال،جفاف الفم.

- اعراض جلدية: طفح جلدي،إنتفاخ كوينك، إلتهاب الأوعية الدموية،طفح

وردي، طفح يسروع.

- نقص صوديوم النج.

- إرتفاع انزيمات ناقلة الأمين، إلتهاب الكبد.

- اضطرابات رئوية،قلبية،جنسية،تنفسية.

- اضطرابات نفسية.

شروط الحفظ :

يحفظ في مكان بارد وجاف بعيدا عن أشعة الشمس.

لا يترك في متناول الأطفال.

التقديم :

علبة تحتوي على 20 كبسولة.

الصف الصيدلاني العلاجي :

مضاد الإكتئاب ، ثلاثي الحلقات.

دواعي الإستعمال :

- حالات الإكتئاب.

- حالات الوسواس القهري.

المقادير وطريقة الإستعمال :

يؤخذ هذا الدواء في جرعة واحدة في اليوم ، صباحا أو مساء بعد أو قبل الأكل لكن من الأفضل تجنب وقت النوم.

موانع الإستعمال :

مطلقة :

- حساسية لهذا الدواء أو لأحد مكوناته .

- الأطفال اقل من 15 سنة.

- مثبطات احادي امينو اوكسيداز غير انتقائي.

نسبية :

- مثبطات احادي امينو اوكسيداز انتقائية زمرة A.

- الإرضاع.

إحتياطات الإستعمال :

- شرب الكحول غير منصح به عند تناول هذا الدواء.

- الأشخاص المسنون المصابون أو الذين لديهم سوابق لمرض الصرع.

- امراض الكبد.

- السكري.

- الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات دموية.

- تناول الادوية المثبطة لتخثر الدم عن طريق الفم.

تفاعلات دوائية :

الادوية الممنوعة :

- مثبطات احادي امينو اوكسيداز غير انتقائي.

مصنوع من طرف : مخبر نيوميديك

Neomedic

10، المنطقة الصناعية بالما ، قسنطينة - الجزائر.